

Sahada tıbbi tedavi ve ekipman sorunu olabilmektedir. Sahada ihtiyaç halinde uygulanabilecek Akupunktur önerileri. (Akupunktur eğitimi almış hekimler için) Bir hocamızdan 𐄂

𐄂 Eger yogun travma ezilme durumlari varsa agri icin bir protokol var, en azindan primer mudahaleye ulasana kadar kullanılabilir. Sahada agrili durumlar icin askeri akupunktur protokolu (Battlefield akupunktur), asp yoksa celik igne de kullanılabilir. Vagal senkop olmaması icin sirayla ve kontrollu öneriliyor.

𐄂 Master Tung perspektifinden de bu gibi durumlarda, bayılma, travma gibi ciddi durumlarda Kalp 8 ve Mide 34 noktaları (22.10 ve 88.28 tung gizli aile rahatlatıcı özellik noktalarından) kullanılabilir. Kalp 8 yuzeyel ignelenip 3-5 dk max önerilir, st34 ise travmanın ağır olduğu taraf varsa o tarafa, taraf yoksa bilateral ignelenip çekilir. Aynı protokol igneleme sonrası bayılma, veya yuzunde ani renk solması olan vakalar için de bizzat Dong'un önerisidir. Bu sogukta ne, ne kadar yapılabilir meçhul ama akilda tutmakta fayda var.

𐄂 Kronik surec acısından yogun du20 ve ren 17 hassasiyeti varsa ansiyete, depresyon için. Du20, Yintang, PC6, H7, LU9, LR3, KID3 protokolü de uygulanabilir.

𐄂 Eger ac kalmis duskun gozukuyorsa merkezi guclendirmek için ST36 VE SP3. Sonrası yanıtı göre şekillenir.

𐄂 Çok duskun hastalarda sp9 un 1.5 cun distali eklenebilir. Bir de sp6 yi akilda tutmakta fayda var.

𐄂 Çok fazla igne kullanmayın (tedavi basına 8-10 u gecmesin)

𐄂 Noktalar tek taraflı uygulanabilir, hangi taraf hassas ise.

𐄂 Hastalar akut safhada olduğu için çok yogun stimulyasyon yapmamak gerek

𐄂 Hastaları bireysel olarak değerlendirmeyi göz ardı etmeden uygulanabilir.